

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



LORRAINE

GRANDES CULTURES

Bulletin n° 17 du 22 août 1990

COLZA :

- Limaces : lères observations.

CEREALES :

- Désherbage automne : - Nouveaux produits
- Dépliant ITCF - SPV
- Mosaïque de l'orge
- Pyrale maïs : Signaler les dégâts

TOUTES CULTURES : Limitation d'utilisation de l'atrazine, de la simazine et du lindane

COLZA :

- Limaces :

Les piégeages ont repris dans nos différentes parcelles dès le retour des premières pluies après la moisson, les résultats sont les suivants :

LIEU	PLUVIOMETRIE	LIMACES m/2 Piégeage du 16 août
MERVILLER (54)	Paille enfouie 26 mm pluie	2,4
BECHAMPS (54)	Paille brûlée 8 mm pluie	0
BIONCOURT (57)	Paille enlevée 19 mm pluie	0

Surveiller bien les premiers semis, la sécheresse n'a pas entravé l'activité des limaces qui n'attendaient que la pluie pour sortir.

CEREALES :

1° Désherbage d'automne : Nouveaux Herbicides

- SQUAL SUPER DG de la société GIBA GEIGY (fluoroglycofène (1,2 g/l), triasulfuron (0,5 g/l) isoproturon (43,3 g/l)) sous forme de sachets hydrosolubles.

7226

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51



ABONNEMENT ANNUEL 215 F

S'utilise à 3,5 g/ha sur blé et orge d'hiver à partir du stade 3 feuilles jusqu'à plein tallage sur adventices jeunes. Le produit peut être utilisé par température basse (3 à 4 °C) et ne devra plus être appliqué après le 1er avril.

Possède une très bonne efficacité sur l'ensemble des graminées sauf Folle avoine, a en outre une bonne action sur pensées.

- FIRST de la société RHODIAGRI-LITTORALE (bromoxynil (125 g/l), (ioxynil (75 g/l) et diflufenicanil (40 g/l), est autorisé sur blé et orge d'hiver à la dose de 2 l/ha du stade 3 feuilles à fin tallage. Les doses peuvent être adaptées sur adventices très jeunes. Cet antidicotyledone spécifique pourra s'utiliser en programme ou mélange avec des antigraminées. Il est très efficace sur Veroniques, stellaires, pensées, crucifères, myosotis, alchemille, ceraistre, lamier et il contrôle bien les adventices jeunes suivantes : matricaire, fumeterre, coquelicot, geranium, et gaillet (levées ultérieures échelonnées non contrôlées). Peu dépendant des conditions climatiques il peut convenir aux applications d'automne mais sera plus généralement utilisé lors de la reprise de végétation de la céréale.

- FOXPRO D+ et FOXTAR D+ de la société PEPRO dont le MCPP est remplacé par du MCPP isomère, gardent les mêmes caractéristiques que ses prédécesseurs FOXPRO et FOXTAR mais s'utilisent respectivement à 2,5 l et 5 l/ha.

2° Mosaïque de l'Orge :

Attention ce virus est maintenant rencontré dans toutes les régions Lorraine. Si vous avez constaté sa présence, même faible, dans une de vos parcelles utilisez des variétés résistantes (renseignez-vous auprès de vos fournisseurs de semence). Nous vous rappelons que le blé n'est pas sensible à la mosaïque de l'orge.

3° Pyrale Maïs :

Afin de remplir nos cages d'élevage et prévoir la date de traitement contre la pyrale en 1991, nous avons besoin de tiges de maïs infestées. Si vous avez connaissance de parcelles de maïs avec au minimum 50 à 60 % de pieds contaminés, vous pouvez nous contacter au 38, rue Sainte Catherine, tel : 83.30.41.51

TOUTES CULTURES :

- LIMITATIONS D'UTILISATION DE L'ATRAZINE, DE LA SIMAZINE ET DU LINDANE

Sur proposition du Comité d'Homologation, le Ministère de l'Agriculture limite les autorisations de vente et l'utilisation des produits à base d'atrazine, de simazine et de lindane. La décision prise le 1er juin 1990 est d'application immédiate.

* SPECIALITES A BASE D'ATRAZINE OU DE SIMAZINE : Les autorisations sont limitées aux seuls usages où la dose d'atrazine et/ou de simazine ne dépasse pas 1 500 g/ha.

* SPECIALITES A BASE DE LINDANE : Tous les traitements foliaires, les traitements de semences des betteraves et des crucifères oléagineuses sont désormais interdits.

Les autorisations sont limitées aux seuls usages où la dose de lindane n'excède pas 1 350 g/ha en traitement de sol.

